

Применение акупунктурной релаксации при одномоментном двойном контрастировании толстой кишки.

Гендлина. И.О., Лепилов Ю.А., Васильков А.Ф.

Александро-Мариинская областная клиническая больница № 1.

Астрахань, Россия

Вопросами диагностики заболеваний толстой кишки с использованием одномоментного двойного контрастирования в нашей стране и за рубежом успешно занимались многие авторы (П.В.Власов, Л.М. Портной, Н.А. Рябухина и др.). Как показывают работы этих авторов – это простая по исполнению, эффективная и высокоинформативная методика заслуженно получила широкое распространение в лечебно-профилактических учреждениях.

Методика одномоментного двойного контрастирования толстой кишки имеет три основных аспекта: подготовку больных, использование адекватного контрастного препарата и собственно технологию контрастирования и рентгенографии толстой кишки.

Повысить диагностическую ценность данной методики помогает применение релаксации /медикаментозной, зондовой, акупунктурной/. Часто рентгенологическая картина бывает недостаточно информативна из-за изменения тонуса и моторики, которые проявляются в виде слабости перистальтики, повышения тонуса, спазма мускулатуры и являются источником диагностических ошибок, затрудняют выявление органических изменений.

Метод акупунктурной релаксации при R-логическом исследовании желудка и двенадцатиперстной кишки с использованием с использованием корпоральных и аурикулярных точек был предложен в середине 80-х годов группой врачей (Рабкин И.Х. и др.) из ВНЦХ.

Нами разработан и с 1996 года применяется метод акупунктурной релаксации при проведении одномоментного двойного контрастирования толстой кишки с использованием точек микроакупунктурной системы кисти /воздействие по точкам соответствия, по 6 Энергиям; Пак Чжэ Ву/. Методика позволяет осуществлять целенаправленное локальное воздействие на участки толстой кишки в контексте с целью диагностического исследования, которая была поставлена перед нами.

Индивидуальный подбор точек, метода воздействия у каждого конкретного больного позволяет повысить эффективность проводимой акупунктурной релаксации.

R-логическое исследование толстой кишки (одномоментное двойное контрастирование) в условиях акупунктурной релаксации/ проводится в 2 этапа:

Первый этап – наложение акупунктурной релаксации в кабинете рефлексотерапии. Продолжительность сеанса около 25 минут.

Второй этап – изучение состояния толстой кишки в R-логическом кабинете при проведении ирригоскопии методикой одномоментного двойного контрастирования, после снятия игл.

При помощи данной методики нами было обследовано около 1000 человек. Выявлено:

- Изменения характерные для энтероколита - 104
- Хронический аппендицит -72
- Органические изменения - 96
- Болезнь Крона - 4
- Рубцово-спаечная деформация слепой кишки и червеобразного отростка - 72
- Баугинит – 46
- Спастическая дискинезия толстой кишки - 107
- Дивертикулез - 213
- Аппендикулярный инфильтрат - 22

- Липоматоз баугиниевой заслонки -10
- Неспецифический язвенный колит – 6

У остальных пациентов после применения этой методики удалось исключить ранее заподозренную патологию.

Учитывая главные преимущества акупунктурной релаксации – ее достаточно высокую эффективность, возможность целенаправленного воздействия, безвредность, простоту применения, экономичность, можно считать эту методику перспективной в решении вопросов рентгенологической диагностики.